



## VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### Lakossági tájékoztatás – gombamérgezések megelőzéséről

Az átlagosnál csapadékosabb nyár kedvezett a vadon termő gombák szaporodásának, ezzel együtt jár, hogy megnövekszik a gombamérgezések száma is.

A **gombászás** kellemes időtöltés, de néhány fontos alapszabályt be kell tartani, hogy csak gombaszakértő által megvizsgált gombát fogyasszunk és nem vizsgált gombát soha ne ajándékozzunk ismerősöknek. A **gombák** ugyanis súlyos, akár halálos **mérgezést** is okozhatnak!

- A **gyilkos galóca** és a gyilkos galóca típusú **mérgezés** a legsúlyosabb, esetleg halálos kimenetelű is lehet, azonban gyakoriak az egyéb **gombák** által okozott mérgezések, melyek lappangási ideje jóval rövidebb. Hányással, hasmenéssel vagy idegrendszeri tünetekkel (zavartsággal, hallucinációkkal) járnak, ritkán halálos kimenetelűek. – Ha a **gomba** elfogyasztását követő két órán belül jelentkeznek a tünetek, akkor nagy valószínűség szerint nem **gyilkos galóca** típusú mérgezésről van szó.
- A **gyilkos galóca mérgezés** gyomorrontást idéző tünetei ugyanis fél és 1 nap után jelentkeznek, majd a 3. napig javulás figyelhető meg, azonban a 3 és 6 nap között már olyan súlyos máj- és veseelégtelenség alakulhat ki, amikor csak a transzplantáció, azaz szervátültetés mentheti meg a beteget.
- A kezelés minél hamarabb megkezdése érdekében - a tünetek észlelését követően minden esetben **forduljon orvoshoz** és vigyen mintát a gombából, vagy az elkészített ételből, illetve tisztítási hulladékból, mert így a gyanúsított gombafajtája gyorsabban azonosítható. Nagyon fontos, hogy hányan ettek még a gombából készült ételből. Értesítsen minden fogyasztót a megbetegedéséről és tájékoztassa őket arról, hogy ők is forduljanak minél előbb orvoshoz.
- Fontos továbbá a maradék étel további fogyasztásának megakadályozása!